

Cremor basalis / Basiscreme



Basiscreme (Cremor basalis) je monografován v Německém farmaceutickém kodexu (Deutscher Arzneimittel-Codex, DAC) a jedná se o nejčastěji monografovaný krémový základ ve standardní receptuře (Neues Rezeptur-Formularium, NRF). To umožňuje aplikaci zahraničních standardizovaných receptur do našich podmínek s ověřenou expirací až 6-12 měsíců.

Použití Cremor basalis

V magistraliter přípravě

- vehikulum pro širokou škálu topických přípravků na kůži s protizánětlivým a antiinfekčním účinkem
- je kompatibilní s látkami neionogenními, kationaktivními i některými anionaktivními
- je vhodný jako základ k vemulgování hydrofilních i lipofilních kapalin
- je vhodnou alternativou pro pacienty citlivé na běžné konzervanty (neobsahuje parabeny, chlorhexidin ani sorbáty)

Samostatně

- vhodný u subakutních a chronických dermatitid pro vysoký obsah lipofilní fáze (vykazuje nižší chladivý účinek na kůži než jiné hydrofilní krémy s vyšším obsahem vody)
- použitelný u seboroického i sebostatického typu kůže
- indiferentní emoliens při suché pokožce, léčba svědění způsobeného xerózou
- intervalová terapie při atopické dermatitidě a psoriáze

Zdroj: • Deutscher Arzneimittel-Codex • Neues Rezeptur-Formularium • Hašek J Nový krémový základ Basiscreme. Konference Fagron Academy - Magistraliter v dermatologii. 09/2014 • Hašek J Basiscreme DAC – nový krémový základ pro magistraliter přípravu I.. Prakt. lékáren. 2014; 5(6)

Nový krémový základ pro magistraliter přípravu polotuhých topických přípravků

Cremor basalis neboli Basiscreme DAC je krémový základ povahy hydrofilního krému (typ emulze o/v). Jeho ambifilní charakter umožňuje zapracovat látky hydrofilní i lipofilní bez narušení emulzního systému, díky vyššímu podílu lipidů však pokožku nevysušuje, ale promašťuje.

Neiontová povaha základu jej činí kompatibilním se širokou škálou léčiv. Nové možnosti se otevírají zejména při formulaci látek kationaktivní povahy. Základ drží konzistenci v kyselém i zásaditém pH.

Konzervace

Basiscreme je konzervován propylen-glykolem (podíl ve vodné fázi je 20 %), jehož účinnost není závislá na pH. Přídavkem vody však poklesne jeho konzervační účinnost snížením koncentrace propylenglykolu v hydrofilní fázi, proto je pro zachování konzervační účinnosti potřebné upravit množství propylenglykolu.

Inkompatibility

Cremor basalis vykazuje inkompatibility s látkami fenolického charakteru, které v závislosti na koncentraci mohou narušit emulzní systém. Dále je inkompatibilní s taninem, triklosanem a kyselinou salicylovou v koncentraci nad 5%.
Není vhodný u pacientů s přecitlivělostí na cetylalkohol a propylenglykol.

Objednávejte na shop.fagron.cz
nebo na zelené lince 800 138 759
ve velikostech balení 250 g a 1000 g.